

Die Impfungen sollten zum frühestmöglichen Zeitpunkt erfolgen.
 Die Überprüfung des Impfstatus ist in jedem Lebensalter sinnvoll.
 Fehlende Impfungen sollten sofort, entsprechend den STIKO-Empfehlungen für das jeweilige Lebensalter, nachgeholt werden.

Empfehlungen der Ständigen Impfkommission (STIKO), 2020/2021
 Quelle: Robert Koch-Institut
 www.rki.de

Gemeinsam
 Verantwortung übernehmen



www.mv-impft.de

Impfung	Alter	in Wochen		in Monaten							in Jahren								
		6	2	3	4	5-10	11*	12	13-14	15	16-23	2-4	5-6	7-8	9-14	15-16	17	ab 18	ab 60
				U4		U5	U6				U7	U7a/U8	U9	U10	U11/J1		J2		
Rotaviren		G1 ^g		G2	(G3)														
Tetanus	^b		G1	N	G2	N	G3 ^c	N			A1	N	A2	N	A ^e				
Diphtherie	^b		G1	N	G2	N	G3 ^c	N			A1	N	A2	N	A ^e				
Keuchhusten Pertussis	^b		G1	N	G2	N	G3 ^c	N			A1	N	A2	N	A3 ^e	N			
Hib H. influenzae Typ b	^b		G1	N	G2	N	G3 ^c	N											
Kinderlähmung Poliomyelitis	^b		G1	N	G2	N	G3 ^c	N			A1		N						
Hepatitis B	^b		G1	N	G2	N	G3 ^c	N											
Pneumokokken	^b		G1	N	G2	N	G3 ^c	N								S ^g			
Meningokokken Serogruppe C								G1	N										
Masern							G1	N	G2	N				S ^f					
Mumps / Röteln							G1	N	G2	N									
Windpocken Varizellen							G1	N	G2	N									
HPV Humane Papillomviren													G1 ^d	G2 ^d	N				
Gürtelrose Herpes zoster																	G1 ^h	G2 ^h	
Grippe Influenza																	S (jährlich)		



Ministerium für Wirtschaft,
 Arbeit und Gesundheit



- ERLÄUTERUNGEN**
- G** GRUNDIMMUNISIERUNG (in bis zu 3 Teilimpfungen G1 - G3)
 - S** STANDARDIMPFUNG
 - A** AUFFRISCHIMPFUNG
 - N** NACHHOLIMPFUNG (Grundimmunisierung bzw. Erstimmunisierung aller noch nicht Geimpften bzw. Komplettierung einer unvollständigen Impfserie)
 - U** Früherkennungsuntersuchung
 - J** Jugenduntersuchung (J1 im Alter von 12 - 14 Jahren)

- ^a Erste Impfstoffdosis bereits ab dem Alter von 6 Wochen, je nach verwendetem Impfstoff 2 bzw. 3 Impfstoffdosen im Abstand von mind. 4 Wochen
- ^b Frühgeborene: zusätzliche Impfstoffdosis im Alter von 3 Monaten, d. h. insgesamt 4 Impfstoffdosen
- ^c Mindestabstand zur vorangegangenen Dosis: 6 Monate
- ^d Zwei Impfstoffdosen im Abstand von mind. 5 Monaten, bei Nachholimpfung beginnend im Alter > 14 Jahren oder bei Impfabstand von < 5 Monaten ist zwischen 1. und 2. Dosis eine 3. Dosis erforderlich

- ^e Td-Auffrischimpfung alle 10 Jahre. Nächste fällige Td-Impfung einmalig als Tdap- bzw. bei entsprechender Indikation als Tdap-IPV-Kombinationsimpfung
 - ^f Einmalige Impfung mit einem MMR-Impfstoff für alle nach 1970 geborenen Personen ≥ 18 Jahre mit unklarem Impfstatus, ohne Impfung oder mit nur einer Impfung in der Kindheit
 - ^g Impfung mit dem 23-valenten Polysaccharid-Impfstoff
 - ^h Zweimalige Impfung mit dem adjuvantierten Herpes-zoster-Totimpfstoff im Abstand von mind. 2 bis maximal 6 Monaten
- * Impfungen können auf mehrere Impftermine verteilt werden. MMR und V können am selben Termin oder in 4-wöchigem Abstand gegeben werden