

Ärztlicher Nachweis Masernschutz gemäß Masernschutzgesetz

Bei

Name, Vorname _____ geb. am _____

liegt folgender Masernschutz vor:

- vollständig geimpft
 - Personen ≥ 1 Jahr: 1. Masern-Impfung, nächster Impftermin ab _____
 - Personen, die nach 1970 geboren sind und ≥ 2 Jahre: 2. Masern-Impfungen
- unvollständig geimpft
- ungeimpft (ACHTUNG: Kinder < 1 Jahr müssen noch keine Impfung nachweisen; können ohne Nachweis aufgenommen werden)
- ärztlich bestätigter Nachweis einer Masern-Immunität (durch Bluttest, sog. Titerbestimmung)
- ärztlich bestätigte medizinische Kontraindikation für Masernschutzimpfung
- Kein Impfausweis vorgelegt

Datum, Ort

Stempel, Unterschrift Arzt/Ärztin



Die Impfungen sollten zum frühestmöglichen Zeitpunkt erfolgen.
Die Überprüfung des Impfstatus ist in jedem Lebensalter sinnvoll.
Fehlende Impfungen sollten sofort, entsprechend den STIKO-Empfehlungen für das jeweilige Lebensalter, nachgeholt werden.

Empfehlungen der Ständigen Impfkommission (STIKO), 2019/2020
Quelle: Robert Koch-Institut
www.rki.de

Gemeinsam
Verantwortung übernehmen



www.mv-impft.de

Impfung	Alter	Säuglinge			Kleinkinder		Kinder			Jugendlichen			Erwachsene		
	(in Wochen)	6	2	3	4	11-14	15-23	2-4	5-6	7-8	9-14	15-16	17	ab 18	ab 60
				U4		U6	U7	U7A/B	U9	U10	J1				
Tetanus		G1	G2	G3	G4	N		A1	N		A2	N		A f	(alle 10 Jahre, ggf. N)
Diphtherie		G1	G2	G3	G4	N		A1	N		A2	N		A f	(alle 10 Jahre, ggf. N)
Keuchhusten <small>Pertussis</small>		G1	G2	G3	G4	N		A1	N		A2	N		A f	(ggf. N)
Kinderlähmung <small>Poliomyelitis</small>		G1	G2 ^g	G3	G4	N					A1	N		ggf. N	
Hepatitis B		G1	G2 ^g	G3	G4	N									
Hib <small>Haemophilus influenzae Typ b</small>		G1	G2 ^g	G3	G4	N									
Pneumokokken ^g		G1		G2	G3	N									S ^e
Rotaviren		G1 ^b	G2	[G3]											
Meningokokken <small>Serogruppe C</small>						G1 (ab 12 Monaten)	N								
Masern					G1	G2	N							S ^d	
Mumps / Röteln					G1	G2	N								
Windpocken <small>Varizellen</small>					G1	G2	N								
HPV <small>Humane Papillomviren</small>										G1 ^e	G2 ^e		N ^e		
Gürtelrose <small>Herpes zoster</small>															G1 + G2 ^h
Grippe <small>Influenza</small>							S (für bestimmte Personengruppen jährlich; Schwangere)							S (jährlich)	

ERLÄUTERUNGEN

- G** GRUNDIMMUNISIERUNG (in bis zu 4 Teilimpfungen G1 - G4)
- S** STANDARDIMPFUNG
- A** AUFFRISCHIMPFUNG
- N** NACHHOLIMPFUNG (Grundimmunisierung aller noch nicht Geimpften bzw. Komplettierung einer unvollständigen Impfserie)
- U** Früherkennungsuntersuchung
- J** Jugenduntersuchung (J1 im Alter von 12 - 14 Jahren)

- a** Bei Anwendung eines monovalenten Impfstoffes kann diese Dosis entfallen.
- b** Die 1. Impfung sollte bereits ab dem Alter von 6 Wochen erfolgen, je nach verwendetem Impfstoff sind 2 bzw. 3 Dosen im Abstand von mindestens 4 Wochen erforderlich.
- c** Impfungen mit Polysaccharid-Impfstoff. Auffrischung nur für bestimmte Indikationen empfohlen.
- d** Einmalige Impfung mit einem MMR Impfstoff für alle nach 1970 geborenen Personen ≥ 18 Jahre mit unklarem Impfstatus, ohne Impfung oder nur mit einer Impfung in der Kindheit.
- e** Standardimpfungen für Mädchen und Jungen im Alter von 9 - 14 Jahren. Für Nachholimpfungen und Anzahl der Impfdosen Fachinformation beachten.
- f** Td-Auffrischung alle 10 Jahre. Die nächste fällige Td-Impfung einmalig als Tdap- bzw. bei entsprechender Indikation als Tdap-IPV-Kombinationsimpfung.
- g** Frühgeborene erhalten eine zusätzliche Impfdosis im Alter von 3 Monaten, d. h. insgesamt 4 Dosen.
- h** Zweimalige Impfung mit dem Totimpfstoff im Abstand von mindestens 2 und maximal 6 Monaten.

MV

Mecklenburg-Vorpommern
Ministerium für Wirtschaft,
Arbeit und Gesundheit

LAGUS
Landesamt für Gesundheit und Soziales M-V