

Die Impfungen sollten zum frühestmöglichen Zeitpunkt erfolgen.
 Die Überprüfung des Impfstatus ist in jedem Lebensalter sinnvoll.
 Fehlende Impfungen sollten sofort, entsprechend den STIKO-Empfehlungen für das jeweilige Lebensalter, nachgeholt werden.

Empfehlungen der Ständigen Impfkommission (STIKO), 2023
 Quelle: Robert Koch-Institut
 www.rki.de

Gemeinsam
 Verantwortung übernehmen



www.mv-impft.de

Impfung	Alter	in Wochen		in Monaten								in Jahren							
		6	2	3	4	5-10	11*	12	13-14	15	16-23	2-4	5-6	7-8	9-14	15-16	17	ab 18	ab 60
		U4			U5	U6					U7	U7a/U8	U9	U10	U11/J1		J2		
Rotaviren		G1 ^a		G2	(G3)														
Tetanus	^b		G1	N	G2	N	G3 ^c	N				A1	N	A2	N	A	^e		
Diphtherie	^b		G1	N	G2	N	G3 ^c	N				A1	N	A2	N	A	^e		
Keuchhusten Pertussis	^b		G1	N	G2	N	G3 ^c	N				A1	N	A2	N	A3 ^e	N		
Hib H. influenzae Typ b	^b		G1	N	G2	N	G3 ^c	N											
Kinderlähmung Poliomyelitis	^b		G1	N	G2	N	G3 ^c	N				A1	N						
Hepatitis B	^b		G1	N	G2	N	G3 ^c	N											
Pneumokokken	^b		G1	N	G2	N	G3 ^c	N										S ^e	
Meningokokken Serogruppe C								G1	N										
Masern								G1	N	G2	N						S ^f		
Mumps / Röteln								G1	N	G2	N								
Windpocken Varizellen								G1	N	G2	N								
HPV Humane Papillomviren													G1 ^d	G2 ^d	N				
Gürtelrose Herpes zoster																		G1 ^h	G2 ^h
Grippe Influenza																		S (jährlich)	
COVID 19																G1 ⁱ	G2 ⁱ	A ⁱ	S ^j



Mecklenburg-Vorpommern
 Ministerium für Soziales,
 Gesundheit und Sport



Landesamt für Gesundheit und Soziales M-V

ERLÄUTERUNGEN

- G** GRUNDIMMUNISIERUNG (in bis zu 3 Teilimpfungen G1 - G3)
- S** STANDARDIMPfung
- A** AUFFRISCHIMPfung
- N** NACHHOLIMPfung (Grundimmunisierung bzw. Erstimmunisierung aller noch nicht Geimpften bzw. Komplettierung einer unvollständigen Impfsreihe)
- U** Früherkennungsuntersuchung
- J** Jugenduntersuchung (J1 im Alter von 12 - 14 Jahren)

- ^a Erste Impfstoffdosis bereits ab dem Alter von 6 Wochen, je nach verwendetem Impfstoff 2 bzw. 3 Impfstoffdosen im Abstand von mind. 4 Wochen
- ^b Frühgeborene: zusätzliche Impfstoffdosis im Alter von 3 Monaten, d. h. insgesamt 4 Impfstoffdosen
- ^c Mindestabstand zur vorangegangenen Dosis: 6 Monate
- ^d Zwei Impfstoffdosen im Abstand von mind. 5 Monaten, bei Nachholimpfung beginnend im Alter > 14 Jahren oder bei Impfabstand von < 5 Monaten ist zwischen 1. und 2. Dosis eine 3. Dosis erforderlich
- ^e Td-Auffrischimpfung alle 10 Jahre. Nächste fällige Td-Impfung einmalig als Tdap- bzw. bei entsprechender Indikation als Tdap-IPV-Kombinationsimpfung
- ^f Einmalige Impfung mit einem MMR-Impfstoff für alle nach 1970 geborenen Personen ≥ 18 Jahre mit unklarem Impfstatus, ohne Impfung oder mit nur einer Impfung in der Kindheit
- ^g Impfung mit dem 23-valenten Polysaccharid-Impfstoff
- ^h Zweimalige Impfung mit dem adjuvantierten Herpes-zoster-Totimpfstoff im Abstand von mind. 2 bis maximal 6 Monaten
- ⁱ Impfabstände entsprechend Fachinformation beachten (zwischen G1 und G2 sowie G2 und A1).
- ^j Wiederholte Auffrischimpfung mit Mindestabstand von 12 Monaten zum letzten Antigenkontakt, vorzugsweise im Herbst.

* Impfungen können auf mehrere Impftermine verteilt werden. MMR und V können am selben Termin oder in 4-wöchigem Abstand gegeben werden.