

Die Impfungen sollten zum frühestmöglichen Zeitpunkt erfolgen.
Die Überprüfung des Impfstatus ist in jedem Lebensalter sinnvoll.
Fehlende Impfungen sollten sofort, entsprechend den STIKO-Empfehlungen für das jeweilige Lebensalter, nachgeholt werden.

Empfehlungen der Ständigen
Impfkommision (STIKO), 2018/2019
Quelle: Robert Koch-Institut
www.rki.de

Gemeinsam
Verantwortung übernehmen



www.mv-impft.de

Alter	(in Wochen)	Säuglinge			Kleinkinder		Kinder			Jugendliche			Erwachsene	
	6	2	3	4	11 - 14	15 - 23	2 - 4	5 - 6	7 - 8	9 - 14	15 - 16	17	ab 18	ab 60
Impfung			U4		U6	U7	U7A/8	U9	U10	J1				
Tetanus		G1	G2	G3	G4	N		A1	N	A2	N		A f (alle 10 Jahre, ggf. N)	
Diphtherie		G1	G2	G3	G4	N		A1	N	A2	N		A f (alle 10 Jahre, ggf. N)	
Keuchhusten Pertussis		G1	G2	G3	G4	N		A1	N	A2	N		A f (ggf. N)	
Kinderlähmung Poliomyelitis		G1	G2 ①	G3	G4	N				A2	N		ggf. N	
Hepatitis B		G1	G2 ①	G3	G4	N								
Hib Haemophilus influenzae Typ b		G1	G2 ①	G3	G4	N								
Pneumokokken ⑨		G1		G2	G3	N							S ①	
Rotaviren	G1 ①	G2	[G3]											
Meningokokken Serogruppe C					G1 (ab 12 Monaten)		N							
Masern					G1	G2	N						S ①	
Mumps Röteln					G1	G2	N							
Windpocken Varizellen					G1	G2	N							
Grippe Influenza					S (Personen mit chronischen Erkrankungen jährlich; Schwangere)								S (jährlich)	
HPV Humane Papillomviren								G1 ①	G2 ①	N ①				

ERLÄUTERUNGEN

- G** GRUNDIMMUNISIERUNG (in bis zu 4 Teilimpfungen G1 - G4)
- S** STANDARDIMPfung
- A** AUFFRISCHIMPfung
- N** NACHHOLIMPfung (Grundimmunisierung aller noch nicht Geimpften bzw. Komplettierung einer unvollständigen Impfserie)
- U** Früherkennungsuntersuchung
- J** Jugenduntersuchung (J1 im Alter von 12 - 14 Jahren)

- ① Bei Anwendung eines monovalenten Impfstoffes kann diese Dosis entfallen.
- ② Die 1. Impfung sollte bereits ab dem Alter von 6 Wochen erfolgen, je nach verwendetem Impfstoff sind 2 bzw. 3 Dosen im Abstand von mindestens 4 Wochen erforderlich.
- ③ Impfung mit Polysaccharid-Impfstoff, Auffrischimpfung nur für bestimmte Indikationen empfohlen.
- ④ Einmalige Impfung mit einem MMR Impfstoff für alle nach 1970 geborenen Personen ≥ 18 mit unklarem Impfstatus, ohne Impfung oder nur mit einer Impfung in der Kindheit.

- ⑤ Standardimpfung für Mädchen und Jungen im Alter von 9 - 14 Jahren. Für Nachholimpfungen und Anzahl der Impfstoffdosen Fachinformation beachten.
- ⑥ Td-Auffrischimpfung alle 10 Jahre. Die nächste fällige Td- Impfung einmalig als Tdap- bzw. bei entsprechender Indikation als Tdap-IPV-Kombinationsimpfung.
- ⑦ Frühgeborene erhalten eine zusätzliche Impfstoffdosis im Alter von 3 Monaten, d.h. insgesamt 4 Dosen.

Mecklenburg
Vorpommern
MV tut gut.

Ministerium für Wirtschaft,
Arbeit und Gesundheit

LAGUS
Landesamt für Gesundheit und Soziales M-V