

Die Impfungen sollten zum frühestmöglichen Zeitpunkt erfolgen.
 Die Überprüfung des Impfstatus ist in jedem Lebensalter sinnvoll.
 Fehlende Impfungen sollten sofort, entsprechend den STIKO-Empfehlungen für das jeweilige Lebensalter, nachgeholt werden.

Empfehlungen der Ständigen Impfkommission (STIKO), 2019/2020
 Quelle: Robert Koch-Institut
 www.rki.de

Gemeinsam
 Verantwortung übernehmen



www.mv-impft.de

Alter	(in Wochen)	Säuglinge		(in Monaten)	Kleinkinder		Kinder			(in Jahren)	Jugendlichen		Erwachsene	
	6	2	3	4	11-14	15-23	2-4	5-6	7-8	9-14	15-16	17	ab 18	ab 60
Impfung			U4		U6	U7	U7A/8	U9	U10	J1				
Tetanus		G1	G2	G3	G4	N		A1	N	A2	N		A f (alle 10 Jahre, ggf. N)	
Diphtherie		G1	G2	G3	G4	N		A1	N	A2	N		A f (alle 10 Jahre, ggf. N)	
Keuchhusten <small>Pertussis</small>		G1	G2	G3	G4	N		A1	N	A2	N		A f (ggf. N)	
Kinderlähmung <small>Poliomyelitis</small>		G1	G2 a	G3	G4	N				A1	N		ggf. N	
Hepatitis B		G1	G2 a	G3	G4	N								
Hib <small>Haemophilus influenzae Typ b</small>		G1	G2 a	G3	G4	N								
Pneumokokken g		G1		G2	G3	N							S c	
Rotaviren	G1 b	G2	(G3)											
Meningokokken <small>Serogruppe C</small>					G1 (ab 12 Monaten)		N							
Masern					G1	G2	N						S d	
Mumps / Röteln					G1	G2	N							
Windpocken <small>Varizellen</small>					G1	G2	N							
HPV <small>Humane Papillomviren</small>									G1 e	G2 e		N e		
Gürtelrose <small>Herpes zoster</small>													G1 + G2 h	
Grippe <small>Influenza</small>					S (für bestimmte Personengruppen jährlich; Schwangere)							S (jährlich)		

ERLÄUTERUNGEN

G	GRUNDIMMUNISIERUNG (in bis zu 4 Teilimpfungen G1 - G4)	a	Bei Anwendung eines monovalenten Impfstoffes kann diese Dosis entfallen.	e	Standardimpfungen für Mädchen und Jungen im Alter von 9 - 14 Jahren. Für Nachholimpfungen und Anzahl der Impfdosen Fachinformation beachten.
S	STANDARDIMPFUNG	b	Die 1. Impfung sollte bereits ab dem Alter von 6 Wochen erfolgen, je nach verwendetem Impfstoff sind 2 bzw. 3 Dosen im Abstand von mindestens 4 Wochen erforderlich.	f	Td-Auffrischimpfung alle 10 Jahre. Die nächste fällige Td-Impfung einmalig als Tdap- bzw. bei entsprechender Indikation als Tdap-IPV-Kombinationsimpfung.
A	AUFRISCHIMPFUNG	c	Impfungen mit Polysaccharid-Impfstoff, Auffrischung nur für bestimmte Indikationen empfohlen.	g	Frühgeborene erhalten eine zusätzliche Impfdosis im Alter von 3 Monaten, d. h. insgesamt 4 Dosen.
N	NACHHOLIMPFUNG (Grundimmunisierung aller noch nicht Geimpften bzw. Komplettierung einer unvollständigen Impfserie)	d	Einmalige Impfung mit einem MMR Impfstoff für alle nach 1970 geborenen Personen ≥ 18 Jahre mit unklarem Impfstatus, ohne Impfung oder nur mit einer Impfung in der Kindheit.	h	Zweimalige Impfung mit dem Totimpfstoff im Abstand von mindestens 2 und maximal 6 Monaten.

U Früherkennungsuntersuchung
J Jugenduntersuchung (J1 im Alter von 12 - 14 Jahren)

30 JAHRE Mecklenburg Vorpommern
MV tut gut.

LAGUS
 Landesamt für Gesundheit und Soziales M-V